



# State of the Art Management of Urticaria in 2019

Satellite Symposium of A. Menarini AG  
at the SSAI annual meeting in Lugano

**Date:** Thursday, 5<sup>th</sup> of September 2019,  
1:15 p.m. - 1:45 p.m.

**Location:** Palazzo dei Congressi,  
6901 Lugano (Symposium 3)

**Chairman  
& Speaker:** Prof. Dr. med.  
Peter Schmid-Grendelmeier

## State of the Art Management of Urticaria in 2019

diagnosis & management  
special aspects in childhood  
future therapeutic options



**A. MENARINI**  
Pharma



# L'antihistaminique différent<sup>1,2</sup>

- action **rapide, puissante et durable**<sup>3,4,5</sup>
- bien toléré<sup>6,7</sup> (sédation comparable à celle sous placebo)<sup>8,9,10</sup>

**Nouveau!**

Comprimé  
orodispersible  
et solution buvable  
pour l'enfant dès  
l'âge de 6 ans<sup>7,11</sup>

<sup>1</sup> Scaglione, F. Safety profile of bilastine: 2nd generation H<sub>1</sub>-antihistamines. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Dec;16(14):1999-2005. | <sup>2</sup> Kuna, P. et al. Efficacy and safety of bilastine 20mg compared with cetirizine 10mg and placebo for the symptomatic treatment of seasonal allergic rhinitis: a randomized, double-blind, parallel-group study. Clin Exp Allergy. 2009 Sep;39(9):1338-47. | <sup>3</sup> Church, MK. Comparative inhibition by bilastine and cetirizine of histamine-induced wheal and flare responses in humans. Inflamm Res. 2011 Dec;60(12):1107-12. | <sup>4</sup> Antonjan, R. et al. Comparative efficacy of bilastine, desloratadine and rupatadine in the suppression of wheal and flare response induced by intradermal histamine in healthy volunteers. Curr Med Res Opin. 2017 Jan;33(1):129-136. | <sup>5</sup> Horak, F. et al. The effects of bilastine compared with cetirizine, fexofenadine, and placebo on allergen-induced nasal and ocular symptoms in patients exposed to aeroallergen in the Vienna Challenge Chamber. Inflamm Res. 2010 May;59(5):391-8. | <sup>6</sup> Information professionnelle Bilaxten®, état septembre 2011. www.swissmedicinfo.ch | <sup>7</sup> Information professionnelle Bilaxten® KIDS, état septembre 2018. www.swissmedicinfo.ch | <sup>8</sup> Valk, PJ. et al. Cognitive Performance Effects of Bilastine 20mg During 6 Hours at 8000 ft Cabin Altitude. Aerosp Med Hum Perform. 2016 Jul;87(7):622-7. | <sup>9</sup> Jáuregui, I. et al. Bilastine: a new antihistamine with an optimal benefit-to-risk ratio for safety during driving. Expert Opin Drug Saf. 2016 Jan;15(1):89-98. | <sup>10</sup> Faré, M. et al. Bilastine vs. hydroxyzine: occupation of brain histamine H<sub>1</sub>-receptors evaluated by positron emission tomography in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2014 Nov;78(5):970-80. | <sup>11</sup> Vozmediano, V. et al. Model Informed Pediatric Development Applied to Bilastine: Orthogistic PK Model Development, Dose Selection for First Time in Children and PK Study Design. Pharm Res. 2017 Dec;34(12):2720-2734.

Les documents et références peuvent être demandés en contactant A. Menarini SA, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, MEBIL4110-19.05E.

**BILAXTEN® C** : Cps à 20 mg de bilastine. **I** : Traitement symptomatique de la rhinocoryza allergique saisonnière et de l'urticaire. **P** : Adultes et adolescents (de plus de 12 ans) : 1 cp 1 x par jour, 1 heure avant ou 2 heures après la prise de nourriture et de jus de fruit. **CI** : Hypersensibilité connue à la bilastine ou à l'un des autres composants du comprimé. **PC** : Co-médication avec inhibiteurs de la P-glycoprotéine, insuffisance rénale modérée. Expérience insuffisante lors d'insuffisance rénale ou hépatique sévère. **IA** : Nourriture, jus de pamplemousse, kétoconazole ou érythromycine, diliazem. **EI** : Fréquents : céphalées, vertiges, fatigue ; peu fréquents : augmentation de l'appétit, anxiété, insomnie, troubles GI. **E** : 10°, 30°, 50° (B) \* admis aux caisses. Pour les informations détaillées consultez SVP www.swissmedicinfo.ch. A. Menarini SA, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, V01.

**BILAXTEN® KIDS C** : cps orodispersibles à 10 mg de bilastine, solution buvable 2.5 mg/ml bilastine. **I** : traitement symptomatique de la rhinocoryza allergique saisonnière et de l'urticaire. **P** : enfants de 6-11 ans : 1 cp orodispersible ou 4 ml de solution buvable 1 x par jour, 1 heure avant ou 2 heures après la prise de nourriture ou de jus de fruit. **CI** : Hypersensibilité connue à la bilastine ou à l'un des autres composants du comprimé. **PC** : ne pas utiliser chez les enfants <6ans, co-médication avec inhibiteurs de la P-glycoprotéine, insuffisance rénale modérée. Solution buvable : contient du Methyl(4-hydroxybenzoate). Expérience insuffisante lors d'insuffisance rénale ou hépatique sévère. **IA** : nourriture, jus de pamplemousse, kétoconazole ou érythromycine, diliazem. **EI** : fréquents : maux de tête, conjonctivite allergique; peu fréquents : rhinite, vertige, perte de conscience, irritation des yeux, troubles gastro-intestin, lèvres aux œdème, urticaire, fatigue. **E** : 10, 30, 50 cps orodispersibles, 120ml solution buvable (B) Pour les informations détaillées consultez www.swissmedicinfo.ch. A. Menarini SA, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zurich, V01.

